

# 腸管出血性大腸菌感染症の発生に要注意！ ～保育所等で必要な対策～

## 手洗い

- ・正しい手洗いをしましょう
- ・タオルは個別に使いましょう  
(患者発生時のことを考え、ペーパータオルの用意を)
- ・せっけんは個別に使える液体せっけんを使いましょう
- ・手洗い場の消毒は適切なものを使いましょう



## オムツ交換

- ・糞便処理の手順を徹底しましょう
- ・交換場所を決めましょう
- ・オムツ交換時には手袋をしましょう
- ・交換後に必ず手洗いをしましょう
- ・使用後のオムツの衛生管理を徹底しましょう
- ・オムツの保管場所及び周辺を消毒しましょう




## プールの時間

- ・水質管理を徹底しましょう  
(遊離残留塩素濃度が0.4～1.0 mg/Lになっていること)
- ・プールに入る前にシャワー、お尻洗いをしましょう
- ・排泄が自分でできない乳幼児は他の子と分けましょう
- ・プールから出たらシャワーやうがいをしましょう



## その他の共用設備や遊具

- ・床、棚、窓の清掃や消毒をしましょう  
(乳幼児は何処でも舐める可能性があります)
- ・遊具等の衛生管理を徹底しましょう
- ・ドアノブ、手すり、照明スイッチを消毒しましょう
- ・トイレの清掃と消毒を毎日行いましょう



出典

2012年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf>